

Uno strano caso di dermatite

Maria Erminia Bottiglieri

UOC Gastroenterologia

PO Marcianise

ASL CE

Anamnesi

- ▣ Uomo di anni 41 (nel 2009)
- ▣ 10 anni prima: comparsa di lesioni cutanee (vescicole) pruriginose
- ▣ Giugno 2009: ricovero c/o IDI (Roma) e biopsia lesioni cutanee al braccio: deposito di IgA.

Diagnosi: dermatite erpetiforme. Inizia terapia con dapsonsone con regressione delle lesioni cutanee.

L'intento del nome scelto da Dühring era solo descrittivo:

- dermatite (cioè “infiammazione della pelle”)
- erpetiforme (in “grappoli” simili all’herpes).



Dermatite Erpetiforme

Celiachia della pelle

- **Macule eritematose > papule orticaroidi > vescicole tese**
- **Zona estensoria degli avambracci e i gomiti, le spalle e le ascelle, le ginocchia e la zona pretibiale degli arti inferiori**
- **Distribuzione simmetrica**
- **Prurito importante**
- **Età predominante:** 15-60 anni; l'esordio in genere avviene nella quarta decade
- **Sesso predominante:** maschile > femminile (1,5:1)
- **La patogenesi** della malattia è molto discussa. A favore autoimmune: associazione con altre malattie autoimmuni (Tiroiditi, Lupus eritematoso, diabete insulino-dipendente, miastenia grave, epatite cronica attiva) e la presenza di un infiltrato intraepiteliale di linfociti T attivati.



Dermatite Erpetiforme

Celiachia della pelle

- ▣ 90% no sintomi GI;
- ▣ **75% atrofia dei villi;**
- ▣ Test tiroidei anomali nel 32% dei casi
- ▣ Sensibile alla sospensione del glutine
- ▣ Terapia: dapstone



DH: terapia

- ▣ **Il diaminodifenil-sulfone (dapstone: 100-150 mg/die), il sulfoxone e la sulfapiridina forniscono un rapido miglioramento dei sintomi e dei segni della malattia già nelle prime 3 ore e dopo i primi 1-2 giorni di trattamento non compaiono più nuove lesioni**

Anamnesi

- ▣ Gli viene consigliato di eseguire anticorpi antitrasnglutaminasi (tTg: 86/20) ed EMA che risultano positivi
- ▣ Per la conferma diagnostica viene sottoposto ad EGDscopia con biopsie in seconda porzione duodenale: atrofia subtotale dei villi (lesione tipo 3b sec Marsh);

Diagnosi di celiachia in paziente con
Dermatite erpetiforme
Inizia dieta aglutinata e continua dapstone

Follow Up

- A 6 mesi (Dicembre 2009): tTg negativi; assenza di lesioni cutanee.
- Successivi f.u. (dopo altri 6 mesi e, quindi, ogni 12 mesi): tTg negativi; assenza di lesioni cutanee. Il dapsonsone è stato progressivamente ridotto fino alla sospensione (Dicembre 2010)
- Ultima visita (Luglio 2011): tTg negative; assenza di lesioni cutanee

Take Home Message

nei pazienti con dermatite erpetiforme e/o con
altre malattie autoimmuni... ricerca tTg