



## **COMUNICATO STAMPA**

### **SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE: CAUTELA NELL'USO DI FANS NEI BAMBINI**

*In aumento le reazioni avverse ad alcuni anti-infiammatori non steroidei*

Roma, 02 febbraio 2011 – La **Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale** (SIPPS), in linea con la direttiva del Working Group Pediatrico dell'Agencia Italiana del Farmaco (**AIFA**), invita ad un uso più attento e consapevole dei farmaci anti-infiammatori non steroidei (**FANS**) nei bambini, in particolare ibuprofene e ketoprofene

Negli ultimi cinque anni infatti, a fronte di un aumento esponenziale delle vendite di questi farmaci ad uso pediatrico, si è assistito ad un considerevole **aumento di reazioni avverse** a tali principi attivi, che spesso sono venduti nelle stesse formulazioni destinate agli adulti.

Tra le reazioni avverse segnalate spiccano fra tutte quelle a carico della **cute**, seguite da **emorragie gastrointestinali** e **complicanze renali**.

“Nei più piccoli” - raccomanda il *Dottor Leo Venturelli Specialista in Pediatria e Componente direttivo SIPPS* - “è possibile ricorrere ai **FANS** solo nel caso in cui alla **febbre** si associ un importante **malessere generale**, somministrando solamente quelli ad **elevato indice di sicurezza** (paracetamolo o ibuprofene, ma non entrambi a distanza di poche ore uno dall'altro) e calcolandone le dosi in base al **peso** del bambino e non alla sua età. Per questo motivo è indispensabile rafforzare adeguatamente l'attività di **informazione** per aiutare i genitori ad utilizzare in modo corretto questa classe di farmaci.”

I FANS sono una classe di molecole la cui attività farmacologica consiste nella riduzione dei sintomi di un'infezione locale o sistemica.

L'uso razionale di questi farmaci prevede, nell'adulto, il trattamento della febbre, di stati infiammatori dolorosi e di malattie croniche, ma in ambito pediatrico l'AIFA raccomanda linee guida più restrittive all'utilizzo dei FANS: la febbre elevata e il dolore, ma solo al bisogno e non continuativamente.

In caso di **infezioni respiratorie** pediatriche i FANS devono essere utilizzati **solo** per le **manifestazioni dolorose** di tali infezioni (per esempio l'otalgia o



la faringodinia) in quanto non esistono studi che testimonino la loro efficacia nel ridurre anche gli altri tipi di sintomi.

In ogni caso la **SIPPS** raccomanda di **valutare** attentamente l'esistenza di **fattori** concomitanti che possano **aumentare il profilo di tossicità** del farmaco, quali malattie epatiche e renali, cardiopatia cronica, diabete e malnutrizione.

**UFFICIO STAMPA: GAS COMMUNICATION S.r.l.**

**Paola Perrotta – Livia Gelosi**

**Tel 06 68134260**

[p.perrotta@gascommunication.com](mailto:p.perrotta@gascommunication.com)

[l.gelosi@gascommunication.com](mailto:l.gelosi@gascommunication.com)