

Parliamo di Convulsioni Febrili

**0 meglio di convulsioni insorte in
concomitanza della febbre**

1 °genita di genitori non consang, sesso F, età 2.4 anni

1

Anamnesi familiare: positiva per CF (padre 1 CF all'età di 14 mm)

Anamnesi gravidica: n.d.r.

3 episodi critici, caratterizzati da rotazione dei globi oculari con perdita di coscienza, risoltisi dopo pochi minuti a seguito della somministrazione di Micronoan e.r. e seguiti da perdita del controllo sfinteriale.

Tali episodi sono comparsi all'età di 1.2, 2.1 e 2.4 anni e contemporaneamente a rialzo della T corporea (T 38 °C)

E.O.G. e E.O.N.: n.d.r.

Esami ematochimici ed EEG in veglia: nella norma

**CONVULSIONI
FEBBRILI SEMPLICI O
COMPLESSE ?**

**2°genita di genitori non consang, sesso F, età 1.4
anni**

**Anamnesi familiare: positiva per CF (padre a 20 mm
e 2.5 aa) e RM (zio paterno)**

Anamnesi gravidica: n.d.r.

**1° ep: 9 mm; T 39 °C; ipertono generalizzato e perdita
di coscienza; durata 6-7 min; risoluzione con
Micronoan e.r.**

E.O.G. ed E.O.N.: n.d.r.

Esami ematochimici: nella norma

EEG in veglia e in sonno: normale

**CONVULSIONI
FEBBRILI SEMPLICI O
COMPLESSE ?**

2° ep: 13 mm; T 39 °C; fissità dello sguardo e tremori generalizzato; durata qualche min; risoluzione spontanea

3° ep: 16 mm; T 41 °C; fissità dello sguardo e contrazioni tonico-cloniche generalizzate; durata 1 h; resistente a tp (Diazepam e.r. e Midazolam e.v.). Eseguiti TC cerebrale (nella norma)

E.O.G. ed E.O.N.: n.d.r.

Esami ematochimici: nella norma

EEG in veglia e in sonno: normale

1 °genita di genitori non consang, sesso F, età 1.3 anni

Anamnesi familiare: positiva per CF (padre)

Anamnesi gravidica: n.d.r.

2 episodi critici, caratterizzati da contrazioni tonico-cloniche generalizzate, deviazione dei bulbi oculari e trisma, della durata di 30 secondi e risoltisi spontaneamente. Tali episodi si sono verificati all'età di 1.3 anni e in concomitanza di T febbrile (T 39,5 °C).

E.O.G. ed E.O.N.: n.d.r.

**Esami ematochimici ed EEG in veglia e in sonno :
nella norma**

**CONVULSIONI
FEBBRILI SEMPLICI O
COMPLESSE ?**

**All'età di 3 anni, crisi convulsiva in
apiressia, della durata di 3-4 minuti**