

Età in anni		somatici 1-4	ansia 5-10	ossess compuls 12-15	depress 19-28	irritab 29-32	opposit provoc 33-37	condot ta 38-42	ADHD totale 43-51	realità 52-55	relazio ni 56-61	anoress 65-67
8-10	F	4	6	2	4	4	4	1	7	1	2	2
	M	4	5	2	4	4	4	1	8	2	2	2
11-13	F	3	5	3	3	3	3	1	6	1	2	2
	M	3	6	3	4	4	4	2	6	2	3	1
14-18	F	3	6	2	4	3	4	1	5	1	2	2
	M	3	5	3	4	4	4	2	6	2	2	2

Tabella 1. Punteggi cut-off alle varie subscale.

Nella prima riga sono indicati i nomi delle principali subscale e i numeri degli items che si riferiscono a ciascuna di esse. I punteggi **uguali o superiori** ai valori indicati suggeriscono la presenza di un problema. Come si vede, i punteggi sono differenti in relazione alla fascia di età e al sesso (F e M).

I punteggi vengono calcolati assegnando **2 punti alle risposte “Vero”, 1 punto a “In parte o a volte vero”, 0 punti a “Falso”**.

Per le altre 10 aree, costituite da solo 1 o 2 items, la risposta “Vero” o “In parte e a volte vero”, segnala già un problema, che va indagato chiedendo al genitore ulteriori informazioni e precisazioni.